

NET VET Pénzügyi, Állategészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Telefon: Nógrádi M. utca 17. - 52/531-663 (9-19 óra), Lehel utca 20. - 52/501-694 (9-16 óra)

E-mail cím: Nógrádi M. utca 17. - netvetkft@gmail.com, Lehel utca 20. - netvetlehel@gmail.com

Időpont-egyeztetés: Nógrádi M. utca 17. - netvetkftidopont@gmail.com, Lehel utca 20. - netvetlehel@gmail.com

MŰTÉT UTÁNI TÁJÉKOZTATÓ

Hogyan bánjunk kedvencünkkel műtét után?

Hazatérve folyamatos felügyelet alatt legyen az első 6-12 órában. Nyugodt körülmények között, fény- és hanginger szegény környezetben tartsuk. Megfelelően temperált helyiségben pihenje ki a műtétet (nagyon fontos, hogy se túl meleg, se túl hideg ne legyen kedvencünk környezete, mert az altatás után még néhány órán keresztül nem működik megfelelően a szervezet hőszabályozása, így hidegben kihűlhet, melegben felhevülhet a teste).

Varratszedésig fontos a seb védelme, ezért a védőgallér vagy a védőruha folyamatos viselete szükséges, hogy a sebet ne nyalogassa, vagy kaparja (kivéve, ha külső varrat nem lett behelyezve, pl.: ragasztott seb esetén).

A szorítókötést a lábvégről hazatérve távolítsuk el.

Az operációt követő napon rendszerint már élénkek, vidámak az állataink, hiszen kipihenték az altatást és a műtéttel járó stresszt.

Mikor ehet/ihat és mit?

Hazatérve, ha már imbolygás nélkül tud menni, kínáljuk először egy kevés vízzel, majd várjunk egy keveset, és ha nem fordul elő hányás, akkor a műtét estéjén fél adag eledelt ehet, kivéve, ha az orvos máshogy nem rendel (pl.: gyomor- vagy bélműtétek esetén). Eledelként a megszokott eleséggel kínáljuk, kivéve, ha az orvos máshogy nem rendel. Ha túl hamar kínáljuk kedvencünket, akár hányás, vagy félrenyelés is lehet a következménye.


Kell-e otthon gyógyszeresen kezelni lábadozó állatunkat?

Általában a műtétek után hosszúhatású fájdalomcsillapítót és antibiotikumot kap kedvencünk, így otthon csak akkor kell gyógykezelnit állatunkat, ha az állatorvos úgy határozza meg (pl.: előzetes szisztémás fertőzés, bélresectio vagy orthopediai műtét után).

Műtét után hosszabb sétára mehetünk-e?

Hazatérve, ha már teljesen magához tért, akkor rövid egészségügyi séta megtehető, kivéve, ha az orvos máshogy nem rendel (pl.: orthopediai műtétek után). Lépcsőzni, ugrándoizni ne hagyjuk, nehogy a még bizonytalan járásuk miatt elessenek, megüssék magukat, vagy a varratok megsérüljenek.

A műtétet követő napon fokozatosan emelhetjük a napi séta mennyiségét, de az legyen rövid, nem megerőltető, kíméljük kedvencünket, hogy mihamarabb felépüljön.



NET VET Pénzügyi, Állategészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Telefon: Nógrádi M. utca 17. - 52/531-663 (9-19 óra), Lehel utca 20. - 52/501-694 (9-16 óra)

E-mail cím: Nógrádi M. utca 17. - netvetkft@gmail.com, Lehel utca 20. - netvetlehel@gmail.com

Időpont-egyeztetés: Nógrádi M. utca 17. - netvetkftidopont@gmail.com, Lehel utca 20. - netvetlehel@gmail.com

Hogyan tartsuk az együtt tartott állatainkat a műtétet követően?

Hazatérve az első 12 órában tartsuk külön állatainkat, mert az altatószerek miatt lelassult, esetleg ingerült vagy félnék kedvencünk eltérően reagálhat más állatok közeledtére. Ezt követően össze lehet engedni őket, kivéve, ha a másik egyed nyalogatja a sebet.

Mikor kell eltávolítani a varratokat?

Általában a műtétet követő 7-10. napon távolítjuk el a varratokat (kivéve, ha az orvos máshogy nem rendeli). Ha külső varratokat nem alkalmaztak kedvencünkönél, úgy varratokat sem kell eltávolítani.

Mikor lehet fürdetni kedvencünket a műtétet követően?

Varratszedés után, ha már az apró sebek is teljesen begyógyultak, akkor lehet leghamarabb fürdetni, kb. az operációt követően egy hónappal. Lábadozó kutyánkat/macskánkat ne fürdessük meg.

Milyen esetben kell a kezelőorvost értesíteni/felkeresni?

Ha a gyógyulás során bármiféle rendellenességet tapasztalunk (seb körüli duzzanat, gennyesedés, kipirultság, vagy ha a több rétegben varratokkal zárt seb külső varratait a kutya kinyalja, kivakarja).

Milyen esetben kell azonnal állatorvoshoz fordulni, esetleg az ügyeletre bevinni kedvencünket?

Váratlan **vészhelyzet** esetében (műtéti sebből származó, nagyfokú, folyamatosan szivárgó vérzés esetén, vagy ha az állat szólításra/érintésre nem reagál, elájul, vagy ha a hasa súlyosan felpuffad, vagy ha a fentiekén kívül olyan elváltozást tapasztalunk, mely aggodalomra ad okot).

Mit tegyünk, ha...

... leszedi a védőgallért?

Mihamarabb helyezzük vissza, és ellenőrizzük a sebet.

... kinyalta a sebet?


Kezeljük le higított betadine-os oldattal, majd mihamarabb jelezzük az állatorvosnak, hogy mi történt.

... gyenge, bujdosik, remeg, nem mozog annyit, mint szokott?

Tartsuk továbbra is felügyelet alatt, de hagyjuk pihenni, hogy az altatószerek mihamarabb kiürüljenek a szervezetéből.

... műtét után kihányja a vizet?

Egy kis időre még vonjuk meg tőle a vizet és az eledelt, és próbáljuk pár órával később.



NET VET Pénzügyi, Állategészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Telefon: Nógrádi M. utca 17. - 52/531-663 (9-19 óra), Lehel utca 20. - 52/501-694 (9-16 óra)

E-mail cím: Nógrádi M. utca 17. - netvetkft@gmail.com, Lehel utca 20. - netvetlehel@gmail.com

Időpont-egyeztetés: Nógrádi M. utca 17. - netvetkftidopont@gmail.com, Lehel utca 20. - netvetlehel@gmail.com

... szomjas a kedvencünk, de még nem tért magához teljesen, imbolyog, vagy remeg?

Egy tiszta, nedves kendővel töröljük meg a száját, esetleg nedvesítsük be a kezünkkel az ínyét, de vízzel még ne kínáljuk. Műtét során infúziós oldatot kapott, így ne féljünk attól, hogy kiszáradna.

... a védőgallér viselése esetén nem tud enni/inni?

Ha szükséges, emeljük meg ideiglenesen az etető/itató tálkát vagy az etetés ideje alatt vegyük le róla a védőgallért, de ezután azonnal helyezzük rá vissza.

... a lábadozás ideje alatt a műtéti terület érzékennyé válik, érintésre a megszokottól eltérően viselkedik?

Hagyjunk időt a gyógyulásra, ne erőltessük a seb kezelését, kivéve, ha az orvos máshogy nem rendeli (pl.: elfertőződött seb kezelése esetén).

... a műtéti seb körül kipirultságot tapasztalunk?

Kis mértékű kipirultság a sebgyógyulás normális velejárója lehet. Ha aggasztónak tűnik a pirosodás mértéke, akkor javasolt felkeresni az állatorvost.

... úgy tűnik, hogy fájdalma van kedvencünknek?

Jelezzük az állatorvosnak, és szükség esetén vigyük kontrollra az állatorvosi rendelőbe. Házilag TILOS emberi fájdalomcsillapító készítményeket adni, hiszen ezek többsége súlyosan mérgező (pl.: ibuprofén, acetilszalicilsav, naproxen, diclofenac, paracetamol, indometacin) kutyánk számára, és akár végzetes is lehet.

... az egyébként kijárós cicánkkal hazatérünk műtét után?

A műtét után 1-2 napig ne engedjük ki még a lakásból, tartsuk zárt-, biztonságos helyen. A kisse még kába cica nem tud idejében elmenekülni egy autó vagy akár egy kutya elől. Ha pedig gallért is kapott, addig ne engedjük ki, amíg az le nem kerül róla, hiszen gallérban a térlátása erősen korlátozott, így a fent említett veszélyforrások fokozottan érvényesek.

Nyitvatartási időben rendelőnk időpont egyeztetés nélkül látja el betegeink kontrollját, a varratok eltávolítását.

Nyitvatartási időn kívül, kizárólag vészhelyzet esetében a városi állatorvosi ügyelet érhető el: +36305659255 (Előzetes telefonos egyeztetés szükséges, folyamatosan nem tartózkodik bent állatorvos. Az ügyeletet hétről hétre más-más rendelő látja el. Az ügyeleti ellátás pótdíjköteles.)