



NET VET Pénzügyi, Állategészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4034 Debrecen, Holló László u. 24.
Telefon 52/531-663, 531-664
Telefon/fax 52/344-427
E-mail netvet@netvet.hu
http://www.netvet.hu

Kutyák oltási programja

Alapimmunizálás:

6-8 hetes korban **Parvovírus** elleni védőoltás

8-10 hetes korban **Parvovírus** elleni védőoltás ismétlése

10-12 hetes korban **kombinált** védőoltás (Szopornyica, Fertőző májgyulladás, Fertőző gége- és légcsőgyulladás, Parvovirusos bélgyulladás, Leptospirosis)

12-14 hetes korban **kombinált** védőoltás ismétlése

14-16 hetes korban **Veszettség** elleni védőoltás

10 hónapos korig a **Veszettség** elleni védőoltás ismétlése

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól (részlet):

Az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén szolgáltató állatorvossal beoltatni 4 hónapos korig, majd az első oltást követően 6 hónapon belül ismét, majd ezt követően évenként. Veszettség ellen csak mikrochippel ellátott kutya oltható. A mikrochippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

Az alapimmunizáláson felül egyedi elbírálás alapján további opcionális védőoltások:

Kennel-köhögés elleni védőoltás: az alapimmunizálást követően, majd évenként ismételve az immunitás fenntartható.

Lyme-kór elleni védőoltás: a betegség szempontjából veszélyeztetett területen ajánlott, évenként ismétlendő.

Herpesvírus elleni védőoltás: a szuka kutyákat a tüzelés alatt vagy a fedeztetés időpontját követő 7-10. napon, majd 1-2 héttel a várható ellés előtt kell immunizálni. Minden vemhesség során az előzőekben említettek szerint kell oltani.

Börgombásság elleni védőoltás: kutyák és macskák 12 hetes kortól vakcinázhatók, alapimmunizálás során 2-3 hét különbséggel kell megismételni az oltást. A vakcinázás hatására jelentkező védettség a második oltást követően egy hónapon belül alakul ki és legalább egy évig tart.