

TERMÉKISMERTETŐ

1. A GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY NEVE

Minera cseppek kutyáknak

2. TERMÉKFORMA

Belsőleges oldat

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml (19 csepp) oldat tartalmaz:

Bór (bórsav formájában)	0,267 mg
Molibdén (ammónium-molibdát-tetrahidrát formájában)	0,0667 mg
Réz (réz-klorid-dihidrát formájában)	0,267 mg
Vas (vas-szulfát heptahidrát formájában)	2,00 mg
Jód (kálium jodát formájában)	0,0167 mg
Magnézium (magnézium-klorid-hexahidrát formájában)	16,7 mg
Mangán (mangán-klorid-tetrahidrát formájában)	0,667 mg
Cink (cink-szulfát-heptahidrát formájában)	1,67 mg
Vanádium (ammónium vanadát formájában)	0,00333 mg
Króm (króm-klorid-hexahidrát formájában)	0,0233 mg
Szelén (nátrium-szelenát formájában)	0,0167 mg

Segédanyagok: almasav, borostyánkősav, glicin, borkősav, mannit, tisztított víz

4. CÉLÁLLATFAJOK

Kutya

5. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, JAVALLATOK

A készítmény nyomelemeket és ásványi anyagokat tartalmaz, alkalmazható megelőzés, vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítése céljából.

Kiegészítő kezelésként alkalmazható anyagcsere zavarok, étvágytalanság, gyengeség esetén, az ellenálló képesség javítására, nyomelemek pótlására, kondícióerősítésre, fertőző betegségek esetén az immunrendszer erősítésére, a gyorsabb felépülés céljából. Műtéti előkészítésre, illetve a műtét utáni felépülés időszakában, daganatos megbetegedésekben a gyógyszeres terápia kiegészítésére, fakó szőrzet, szőrhullás esetén a szőrzet minőségének javítására, a bőr és nyálkahártya védelmére, a bőr regenerálására vedléskor. Kiállításra való felkészítés idején, vemhesség, szoptatás alkalmával, valamint minden olyan állapotban, amikor nyomelem pótlása indokolt.

A készítményt betegségmegelőzés és roborálás céljából 2 hónapig kell adagolni, ami egy hónapos közbeiktatott szünet után megismételhető. Terápiás kiegészítő kezelések (pl. daganatos és fertőző betegségek) esetén a kezelőorvos utasítása szerint kell alkalmazni.

6. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szájon át történő alkalmazásra.

Adagolás: 1 csepp Minera Cseppek kutyáknak testtömeg-kilogrammonként. A készítményt a kutya annyi mennyiségű ivóvizébe vagy táplálékába adagoljuk, amelyet az állat biztosan elfogyaszt. A cseppentő segítségével közvetlenül az állat szájába is adagolható. Tejbe ne keverjük.

7. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival, vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.



8. MELLÉKHATÁSOK

A készítmény egyes összetevőivel szemben allergia alakulhat ki.

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Tejbe keverve a készítmény nem alkalmazható.

10. FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

4 év.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25 °C-on tartandó. A fénytől való megóvás érdekében eredeti csomagolásban tárolandó.

12. CSOMAGOLÁS TÍPUSA ÉS KISZERELÉSE

30, 50, vagy 100 ml oldat garanciazáras, fehér, polietilén csavaros kupakkal és szintelen polietilén cseppentőbetéttel lezárt barna üvegben.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

13. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

14. KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

15. A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt készítmény nem minősül veszélyes anyagnak

16. A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

Béres Gyógyszergyár Zrt.

1037 Budapest,

Mikoviny u. 2-4.

16. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

059/1/2010 (30 ml) MgSzH ÁTI

059/2/2010 (50 ml) MgSzH ÁTI

059/3/2010 (100 ml) MgSzH ÁTI

